


FOSTERA[®] GOLD PCV

MM-22560

Uso Veterinario.



Vacuna de Circovirus Porcino, Tipo 1-Tipo 2 Quimera. Virus inactivado PCV2a y PCV2b.

FÓRMULA

Cada dosis de 2 ml a la liberación contiene:

Vacuna Quimérica Circovirus Porcino tipo 1 y tipo 2 con 2 genotipos PCV2a y PCV2b	RP \geq 1.3
Excipientes c.s.p	2 ml

DESCRIPCIÓN

Vacuna bivalente con virus inactivado con dos genotipos de PCV2, PCV2a y PCV2 b. Ayuda a proteger contra las enfermedades asociadas al Circovirus Porcino causadas por Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2). Contiene el adyuvante MetaStim[®]. Aceite SP es una emulsión utilizada en vacunas para ayudar a provocar una respuesta inmune humoral y mediada por células. Esto preserva los componentes de la vacuna para que los antígenos se liberen lentamente en comparación con otros tipos de adyuvantes.

INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos sanos de tres (3) días de nacidos o mayores contra Circovirus Porcino Tipo 2. Duración de inmunidad de 23 semanas ha sido demostrada. Este producto contiene PCV2a y PCV2b, y se ha demostrado que es efectivo contra la viremia por PCV2; la excreción del virus en las heces; la colonización de tejido linfóide y la depleción linfóide.



PRESENTACIÓN

Contenido neto
Frasco por 50 dosis (100ml)

USO



DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- Administrar una dosis única de 2 mL ó dos dosis de 1 mL con un intervalo de dos semanas en cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

ALMACENAMIENTO



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos solares puede afectar adversamente la potencia.




Almacene a 2°-8°C.



No congele.

FOSTERA[®] GOLD PCV

Reg. ICA No. 10651-BV. Uso Veterinario.



Vacuna de Circovirus Porcino, Tipo 1-Tipo 2 Quimera. Virus inactivado PCV2a y PCV2b.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.



Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.



Lea la etiqueta del producto antes de su uso.



No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.



Consulte al Médico Veterinario