


FOSTERA[®] GOLD PCV MH

MM-22559

Uso Veterinario.

Vacuna de Circovirus Porcino, Tipo 1-Tipo 2 Quimera. Virus inactivado PCV2a y PCV2b. Bacterina contra *Mycoplasma hyopneumoniae*.



FÓRMULA

Cada dosis de 2 ml a la liberación contiene:

Vacuna Quimérica Circovirus Porcino tipo 1 y tipo 2 con 2 genotipos PCV2a y PCV2b	≥1.3 PR
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , cepa P5722-3	≥1.8 PR
Excipientes c.s.p	1 ml

Potencia relativa por dosis a la liberación cPCV1-2b

DESCRIPCIÓN

Vacuna bivalente con virus inactivado con dos genotipos de PCV2, PCV2a y PCV2 b. Ayuda a proteger contra las enfermedades asociadas al Circovirus Porcino causadas por Circovirus Porcino tipo 2 (PCV2). Contiene el adyuvante MetaStim[®]. Aceite SP es una emulsión utilizada en vacunas para ayudar a provocar una respuesta inmune humoral y mediada por células. Esto preserva los componentes de la vacuna para que los antígenos se liberen lentamente en comparación con otros tipos de adyuvantes. Además contiene una bacterina contra *Mycoplasma hyopneumoniae* que protege a los cerdos de la Neumonía Enzoótica Porcina.

INDICACIONES

Para la vacunación de cerdos sanos de tres (3) días de nacidos o mayores contra Circovirus Porcino Tipo 2. Duración de inmunidad de 23 semanas ha sido demostrada. Este producto contiene PCV2a y PCV2b, y se ha demostrado que es efectivo contra la viremia por PCV2; la excreción del virus en las heces; la colonización de tejido linfoide y la depleción linfoide. Controla la Neumonía Enzoótica Porcina ocasionada por la bacteria *Mycoplasma hyopneumoniae*.



PRESENTACIÓN

Contenido neto
Frasco por 50 dosis (100ml)

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

- Administrar una dosis única de 2 mL ó dos aplicaciones de 1 mL con un intervalo de dos semanas en cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

ALMACENAMIENTO



Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



Almacene a 2°-8°C.



La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a los rayos solares puede afectar adversamente la potencia.



No congele.


USO



FOSTERA[®] GOLD PCV MH

Uso Veterinario.

Vacuna de Circovirus Porcino, Tipo 1-Tipo 2 Quimera. Virus inactivado PCV2a y PCV2b. Bacterina contra *Mycoplasma hyopneumoniae*.



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS



Utilizar todo el contenido una vez abierto.



Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada.



Contiene gentamicina y timerosal como conservadores.



Lea la etiqueta del producto antes de su uso.



No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio.



Consulte al Médico Veterinario